

歯周組織再生療法が インプラント治療に与える効果とは

2024
3/13 水
19:30 ~ 21:00

開催方式 Zoom ウェビナーによる LIVE 配信 参加費 無料

参加方法 事前登録制 (下記 URL または二次元コードよりお申し込みください)
<https://x.gd/MzvhG>

ご記入/ご入力いただいた個人情報は、京セラおよび科研製薬の個人情報保護に関する取組みに従い、取り扱います。
同意のうえ、次にお進みください。



イントロダクション

リグロス、リフィット、 FINESIA IMPLANT の特徴と有効活用

覚本 嘉美 先生 (覚本歯科医院)



再生療法パート

GPが取り組む歯周組織再生療法の勘どころ

八木原 淳史 先生 (ファミリー歯科医院)



インプラント治療 (骨造成) パート

国産 FINESIA インプラントで勝ち取る ゼロボーンロス

鈴木 章弘 先生 (鈴木歯科医院)



京セラ FINESIA と GBR 同時埋入

大塚 保光 先生 (おおつか歯科クリニック)



まとめ

再生療法と骨造成は難しくない！ 失敗しないための原則とポイント

遠藤 学 先生 (えんどう歯科医院)



総合ディスカッション・質疑応答

覚本 嘉美 先生 (覚本歯科医院)

FINESIA®

Relios



京セラ株式会社 メディカル事業部 本社：〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 WEBサイト：<https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/>
販売名：FINESIA BLフィクチャー BE 分類：高度管理医療機器 一般的名称：歯科用インプラントフィクチャー 承認番号：30400BZX00158000 クラス分類：III © 2023 KYOCERA Corporation 「FINESIA」および「Relios」は京セラ株式会社の登録商標です。

www.finesia.world

Drug Information

●詳細は電子化された添付文書をご参照ください。電子化された添付文書の改訂に十分ご注意ください。

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 口腔内に悪性腫瘍のある患者又はその既往歴のある患者
[本剤が細胞増殖促進作用を有するため]

4. 効能又は効果

歯周炎による歯槽骨の欠損

5. 効能又は効果に関連する注意

- 5.1 本剤は、歯周ポケットの深さが4mm以上、骨欠損の深さが3mm以上の垂直性骨欠損がある場合に使用すること。
- 5.2 本剤は、インプラント治療に関する有効性及び安全性は確立していない。
- 5.3 術後に歯肉弁の著しい陥凹を生じると予想される骨欠損部位に対しては、他の適切な治療法を考慮すること。

6. 用法及び用量

歯肉剥離掻爬手術時に歯槽骨欠損部を満たす量を塗布する。

7. 用法及び用量に関連する注意

本剤の使用にあたっては「17.臨床成績」の項を参照し適切な量を用いること。[17.1.2 参照]

8. 重要な基本的注意

本剤は歯周外科手術の経験のある歯科医師又は医師が使用すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	1%以上	1%未満	頻度不明
適用部位および適用部位近傍			歯肉白色化、歯肉紅斑、歯肉腫脹、硬結、肥厚
精神神経系			頭痛
臨床検査	尿中アルブミン陽性、尿中NAG上昇、尿中β ₂ ミクログロブリン上昇	AST上昇、CRP上昇、ビリルビン上昇、CK上昇、ALT上昇、LDH上昇、尿糖陽性、リンパ球増多、好中球減少、総蛋白上昇	単球増多、白血球減少

21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

2023年10月改訂(第1版)



歯周組織再生剤

トラフェルミン(遺伝子組換え)製剤

薬価基準収載

リグロス® 歯科用液キット 600 μ g/1200 μ g

REGROTH® Dental Kit 600 μ g/1200 μ g

処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

製造販売元
[文献請求先及び
問い合わせ先]



科研製薬株式会社

東京都文京区本駒込二丁目28番8号

医薬品情報サービス室